



Caso clinico

Fate clic su Massimo Cecchi e testo
UOC Urologia Versilia



- Paziente di anni 36 con anamnesi negativa per patologie di rilievo
- Da tre anni disuria, mitto ridotto e dolore perineale
- Un esame colturale sperma positivo due anni fa per e.coli e successivi controlli negativi (Meares)
- Esplorazione rettale con modesta flogosi, non noduli palpabili.

Quesiti

- Ecografia transrettale
- Esami colturali
- Altro?



- Leucociti nello sperma, coltura negativa
- Diagnosi di prostatite cronica non batterica IIIa

Classificazione delle prostatiti

I	Prostatite acuta batterica	Infezione acuta della ghiandola prostatica
II	Prostatite cronica batterica	Infezione prostatica cronica, caratterizzata da infezioni ricorrenti del tratto urinario
III	Prostatite cronica/sindrome del dolore pelvico cronico (CP/CPSP)	Sintomi di fastidio o dolore della regione pelvica per almeno tre mesi in assenza di batteri uropatogeni, valutati con tecniche standard
III A	Sindrome da dolore pelvico cronico infiammatorio	Presenza di leucociti nello sperma, nel liquido da massaggio prostatico o nelle urine dopo massaggio prostatico
III B	Sindrome da dolore pelvico cronico non infiammatorio	Assenza di leucociti nello sperma, nel liquido da massaggio prostatico o nelle urine dopo massaggio prostatico
IV	Prostatite infiammatoria asintomatica	Assenza di sintomi soggettivi, rilevata la presenza di leucociti nel secreto prostatico o nello sperma, durante la valutazione di altre forme morbide

Tabella 1. Classificazione delle prostatiti secondo il National Institute of Health - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease (NIH-NIDDK). (tratto e modificato graficamente, da Nickel 2003 ⁶⁷).

quesiti



- Terapia antibiotica empirica
- Terapia di supporto (Deprox, serenoa...)

Conclusioni !

- flussometria patologica
- Uretrografia con stenosi dell'uretra bulbare anulare

